

ปฏิทินผลผลิตการเกษตร

อำเภอท่าช้าง



ปฏิทินผลผลิตการเกษตร อำเภอท่าช้าง

[illegible]

ปฏิทินการดูแลรักษา “กระท้อน”

เดือน	การบำรุงรักษา
มกราคม	เป็นระยะดอกบานและติดผลขนาดเล็กควรให้น้ำสม่ำเสมอ ป้องกันการกำจัดแมลงในระยะช่อดอกและติดผลแล้ว (เว้นการฉีดพ่นในระยะดอกบาน) เช่น เพลลียไฟ หนอนกินดอก หนอนเจาะขี้ผล
กุมภาพันธ์	เป็นระยะที่ผลกำลังเจริญเติบโต ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการกำจัดแมลงเหมือนเดือนมกราคม
มีนาคม	ปฏิบัติเหมือนเดือนกุมภาพันธ์
เมษายน	การตัดแต่งผลและห่อผล
พฤษภาคม	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวทำยสูง เช่น 13-13-21 ในกระท้อนบางพันธุ์อาจจะมีผลแก่สามารถเลือกเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
มิถุนายน-กรกฎาคม	เก็บเกี่ยวผลผลิต หลังเก็บผลผลิตทำการตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี กำจัดวัชพืช
สิงหาคม-กันยายน	ป้องกันกำจัดโรคและแมลง ตามความจำเป็นถ้ามีการระบาดขึ้น
ตุลาคม	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 9-24-24 หรือ 12-24-12 กำจัดวัชพืช
พฤศจิกายน	งดการให้น้ำ
ธันวาคม	เริ่มออกช่อดอก เริ่มให้ น้ำเล็กน้อย อย่างสม่ำเสมอ ป้องกันกำจัดแมลงในระยะช่อดอก

ปฏิทินการดูแลรักษา “มะปราง / มะยงชิด”

เดือน	การปฏิบัติดูแล	การป้องกันโรค / แมลง
เมษายน - พฤษภาคม	เป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เร่งบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย คอก อัตรา 10-30 กก./ต้น ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กิโลกรัม/ ต้น ให้น้ำตามปกติ อย่าปล่อยให้ขาดน้ำ	ตัดแต่งกิ่ง ที่โรคแมลงทำลายเสียหาย เช่น กิ่งแห้ง กิ่งฉีกหัก กิ่งน้ำค้าง กิ่งซ้อน กันออก การกำจัดวัชพืช โดยทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช
มิถุนายน - สิงหาคม	เป็นระยะที่แตกใบอ่อนและเจริญเติบโตทางใบ ถ้าฝนทิ้งช่วง ต้นอายุ 1 ปีขึ้นไป ให้น้ำ 5-7 วัน/ ครั้ง	ถ้ามีการระบาดของราดำ ราแป้ง ใช้ เบนโนไมล แคพแทน แมนโคเซป ส่วนแมลงที่ทำลายใบและลำต้น เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย แมลงค่อมทอง เพลี้ยจักจั่น ใช้ คาร์ บาริล
กันยายน - ตุลาคม	เป็นระยะที่ใบเริ่มแก่จัด ต้นมะปรางจะเข้าสู่ ระยะพัก ตัวและสะสมอาหาร งดการให้น้ำเพื่อให้พืชพักตัวสะสมอาหารและ ไม่แตกใบอ่อน	ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 และ งดการใส่ปุ๋ยที่มี ไนโตรเจนสูง ถ้าต้นมะปรางอายุ 4-5 ปี ใส่ปุ๋ยอัตรา 0.5 กิโลกรัม/ ต้น กำจัดวัชพืชได้ทรงพุ่มออกให้หมด
พฤศจิกายน	เป็นช่วงระยะเริ่มแทงช่อดอกและดอกเริ่มบาน ในช่วงปลายเดือน เริ่มให้น้ำเล็กน้อยเมื่อแทงช่อดอก ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร แค่น้ำดินเปียกและให้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดอกมีความสมบูรณ์ซึ่งจะทำให้ติดผลดี	กำจัดแมลงประเภทเพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย แมลงค่อมทอง เมื่อช่อดอกยืดอกแล้วแต่ยังไม่บาน การปฏิบัติอื่นๆ เช่น ในช่วงที่มะปรางเริ่มแทงช่อดอก ให้น้ำปุ๋ยคอกสด ๆ มากอง ในสวน เพื่อเลี้ยงแมลงวัน สำหรับช่วยในการผสมเกสร



ปฏิทินการดูแลรักษา “มะปราง / มะยงชิด” (ต่อ)

เดือน	การปฏิบัติดูแล	การป้องกันโรค / แมลง
ธันวาคม	เป็นระยะที่ดอกทยอยบานและติดผลขนาดเล็ก ให้น้ำเมื่อติดผลแล้วให้เพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้นที่ละน้อย อย่าให้แบบทันทีซึ่งอาจมีผลต่อการร่วงของผลอ่อน การใส่ปุ๋ย เมื่อติดผลอ่อนขนาดหัวไม้ขีด ให้ใส่ปุ๋ย เร่งการเจริญเติบโตของผล คือ ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีตัวทำยสูง เช่น 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น	เมื่อดอกบาน ให้หยุดพ่นสารเคมีทุกชนิดทันที ระยะผลโตขนาดหัวไม้ขีด ฉีดพ่นกำจัด เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย โดยใช้คาร์บาริล และผสมสารเคมีป้องกันกำจัดโรครา เช่น เบนโนบิล ไธอะเบนดาโซล ป้องกัน โรคแอนแทรคโนส ราดำ ราแป้ง
มกราคม	เป็นระยะที่ผลกำลังเจริญเติบโต การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ 3-5 วัน/ครั้ง	ป้องกันเพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย โดยใช้คาร์บาริล และผสมสารเคมีป้องกันกำจัดโรครา เช่น เบนโนบิล ไธอะเบนดาโซล ป้องกันโรคแอนแทรคโนส ราดำ ราแป้ง ให้ห่อผลเมื่อผลอายุ 3 อาทิตย์ ป้องกันแมลงวันผลไม้ นกและเพิ่ม คุณภาพผล
กุมภาพันธ์	ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและลดปริมาณให้น้อยลง เมื่อผลเริ่มแก่ แต่ต้องสม่ำเสมอเพื่อป้องกันผลแตก เมื่อมีฝนหลงฤดูการใส่ปุ๋ย ในระยะที่มะปรางเริ่มเข้าโคลควรใส่ปุ๋ยเพิ่มคุณภาพของผล คือ ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 13- 13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น และปุ๋ยทางใบ สูตร 13-0-46 หรือ 10-20-30 อัตรา 30-40/น้ำ 20 ลิตร ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์	ควรมีการห่อผลเพื่อป้องกันแมลงวัน ผลไม้ และนกจิกกิน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม	สีเหลืองเข้ม โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เก็บผลให้มี ก้านติดมาด้วยอย่างน้อย 4-5 เซนติเมตร แล้วนำมาไว้ที่ร่ม	